



پایه دوازدهم تجربی

آزمون های شبیه ساز امتحانات نهایی ماز



مرور سه هشتم ابتدایی نیم سال دوم +
پیشروی دوهشتم نیم سال دوم



دفترچه سؤال


پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴







فصل ۴ (درس ۲ و ۳) و فصل ۵ (تا پایان درس ۱): صفحه های ۷۷ تا ۱۱۲



بودجه آزمون

ردیف	درس	تعداد صفحه	زمان پاسخگویی
۱	ریاضی (۳)	۳	۱۱۰ دقیقه

برای شباهت حداکثری به امتحانات نهایی، صفحه آرای، فونت و حتی اندازه متن در تمامی آزمون های تشریحی ماز، کاملاً یکسان با استاندارد امتحانات نهایی در نظر گرفته می شود.

سؤالات آزمون شبیه‌ساز نهایی درس: ریاضی ۳		پایه: دوازدهم		رشته: علوم تجربی		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴		
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:		
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز				
ردیف		سؤالات (پاسخ‌برگ دارد)						نمره
۱		درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. الف) تابع $y = \begin{cases} 2x+1 & x \geq 1 \\ 2x-1 & x < 1 \end{cases}$ در نقطه به طول $x = 1$ مشتق‌پذیر است. ب) نقطه $(1, 1)$ یک نقطه گوشه‌ای برای تابع $f(x) = 2 - x^2$ است. پ) تابع $f(x) = 5$ دارای بی‌شمار نقطه بحرانی است. ت) اگر $x = c$ طول یک نقطه اکسترمم نسبی تابع f باشد، آن‌گاه $f'(c) = 0$.						۱
۲		جاهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف) خط مماس قائم منحنی تابع $y = \sqrt[3]{x}$ است. ب) اگر $f(x) = 2x^3 + 1$ و $g(x) = \sqrt{x}$ باشند، حاصل $(f \times g)'(1) + (f + g)'(4)$ برابر است. پ) اگر $f(x) = x^3 + 4x^2 - 1$ باشد، حاصل $f''(-1)$ برابر است. ت) اگر تابع $y = f(x)$ در بازه $[a, b]$ اکیداً نزولی باشد، علامت مشتق تابع f در این بازه است.						۱
۳		با محاسبه مشتق راست و چپ تابع f در نقطه A، نشان دهید که تابع f در نقطه A مشتق‌پذیر نیست. 						۱/۲۵
۴		مشتق‌پذیری تابع $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ را در نقطه $x = 2$ با استفاده از تعریف مشتق بررسی کنید.						۱/۵
صفحه ۱ از ۳								

سؤالات آزمون شبیه ساز نهایی درس: ریاضی ۳		پایه: دوازدهم		رشته: علوم تجربی		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴			
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:			
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز					
ردیف		سؤالات (پاسخ برگ دارد)						نمره	
۵		نمودار توابع f و g به صورت زیر است:  (الف)  (ب) نمودار مشتق هر کدام از توابع f و g را از بین نمودارهای زیر انتخاب کنید، سپس شماره مربوط به آن را در پاسخ برگ بنویسید. (دو نمودار اضافه است.)  (۱)  (۲)  (۳)  (۴)						۱	
۶		با استفاده از تعریف مشتق نشان دهید اگر $f(x) = \sqrt{x}$ و $x > 0$ ، آن گاه $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.						۱/۲۵	
۷		اگر $f(2) = 7$ و $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{2x - 4} = 5$ باشد، مشتق تابع $g(x) = xf(x)$ را در $x = 2$ به دست آورید.						۱	
۸		مشتق تابع های زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست)							
		الف) $f(x) = (\sqrt{x} + 3x)^7$						۳	
		ب) $g(x) = (5x^3 - x)^9 (\sqrt{2x+1})$							
		پ) $h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^3 - 6x + 1}$							
۹		اگر $f'(1) = 3$ ، $g'(1) = 5$ و $f(1) = 1$ ، مقدار مشتق $(f + g)$ در $x = 1$ را به دست آورید.						۱	
۱۰		تابع $f(x) = 7\sqrt{x} + 50$ قد متوسط کودکان را بر حسب سانتی متر تا حدود ۶۰ ماهگی نشان می دهد که در آن x مدت زمان پس از تولد (بر حسب ماه) است.						۱/۲۵	
		الف) آهنگ متوسط رشد در بازه $[0, 25]$ را به دست آورید.							
		ب) آهنگ لحظه ای تغییر قد کودک در ۴۹ ماهگی را به دست آورید.							
		صفحه ۲ از ۳							

سؤالات آزمون شبیه‌ساز نهایی درس: ریاضی ۳		پایه: دوازدهم		رشته: علوم تجربی		تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴	
تعداد صفحه: ۳		مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه		ساعت شروع:		نام و نام خانوادگی:	
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی				گروه آموزشی ماز			
ردیف		سؤالات (پاسخ‌برگ دارد)					
نمره							
۱۱	تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 1$ مفروض است. در نقطه $x = a$ ، آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع کمتر از آهنگ تغییر متوسط آن در بازه $[0, 3]$ است. محدوده a را بیابید.						
۱۲	با رسم جدول تغییرات نشان دهید که تابع $f(x) = \frac{1}{3}x^4 + x^2 + 1$ در چه بازه‌هایی صعودی و در چه بازه‌هایی نزولی است؟						
۱۳	در شکل زیر نمودار مربوط به یک تابع رسم شده است. طول نقاط اکسترم‌های نسبی و مطلق را مشخص کنید. 						
۱۴	نمودار تابع $f(x) = x^3 + ax + b$ به صورت زیر است. مقادیر a و b را بیابید. 						
۱۵	مقادیر اکسترم‌های مطلق تابع $f(x) = \frac{-2}{3}x^3 - x^2 + 4x + 1$ را در بازه $[-3, 2]$ به دست آورید.						
۲۰	موفق باشید.						
صفحه ۳ از ۳							



پایه دوازدهم تجربی

آزمون‌های شبیه‌ساز امتحانات نهایی ماز



مرور سه هشتم ابتدایی نیم‌سال دوم +

پیشروی دوهشتم نیم‌سال دوم



پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴

پاسخبرگ ریاضی (۳)

برای شباهت حداکثری به امتحانات نهایی، صفحه‌آرایی، فونت و حتی اندازه متن در تمامی آزمون‌های تشریحی ماز، کاملاً یکسان با استاندارد امتحانات نهایی در نظر گرفته می‌شود.

نام و نام خانوادگی:	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع:
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی			
گروه آموزشی ماز			

ردیف	پاسخ برگ	نمره
۱	الف) ب) پ) ت)	۱
۲	الف) ب) پ) ت)	۱
۳		۱/۲۵
۴		۱/۵
۵	الف) ب)	۱
۶		۱/۲۵

آزمون شبیه ساز نهایی درس: ریاضی ۳	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع:
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی			
گروه آموزشی ماز			

ردیف	پاسخ برگ	نمره
۷		۱
۸	الف) ب) پ)	۳
۹		۱

ساعت شروع:	رشته: علوم تجربی	تعداد صفحه: ۴	آزمون شبیه ساز نهایی درس: ریاضی ۳
تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه	پایه دوازدهم	نام و نام خانوادگی:
گروه آموزشی ماز		آزمون شبیه ساز امتحان نهایی	

ردیف	پاسخ برگ	نمره
الف)		
ب)		۱/۲۵
۱۰		
۱۱		۱/۲۵
۱۲		۱/۵
۱۳		۱

آزمون شبیه ساز نهایی درس: ریاضی ۳	تعداد صفحه: ۴	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع:
نام و نام خانوادگی:	پایه دوازدهم	مدت آزمون: ۱۱۰ دقیقه	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴
آزمون شبیه ساز امتحان نهایی		گروه آموزشی ماز	

ردیف	پاسخ برگ	نمره
۱۴		۱
۱۵		۲
	موفق باشید.	۲۰



پایه دوازدهم تجربی

آزمون‌های شبیه‌ساز امتحانات نهایی ماز



مرور سه هشتم ابتدایی نیم سال دوم +
پیشروی دوهشتم نیم سال دوم



دفترچه پاسخ

پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴

فصل ۴ (درس ۲ و ۳) و فصل ۵ (تا پایان درس ۱): صفحه‌های ۷۷ تا ۱۱۲

بودجه آزمون

ویراستاران

طراحان

درس

ارسلان حسنوند - نرجس تیمناک
حمیدرضا ولی‌پور

محدثه شیخعلی - سیدجواد نظری

ریاضی (۳)

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

مصحح شو:



پاسخ دقیق سؤال این جا میاد و اسمش روشه: «مصحح شو»، می خواد شما رو به یه مصحح حرفه‌ای و دقیق تبدیل کنه که بدونین موقع ارزیابی جواب‌هاتون باید حواستون به چی باشه تا توی آزمون‌های بعدی دقیق‌تر عمل کنین. اگه جواب یه سؤال رو بشه به شکل‌های مختلف بیان کرد، اون هم، این جا بهتون گفتیم.

بررسی دقیق‌تر:



اگه پاسخ کوتاه به سؤال کافی نباشه تا ببینین چطوری باید به جواب برسین، توی این بخش با بررسی دقیق‌تر جواب، سؤال رو براتون توضیح دادیم.

نقشه نهایی:



امتحان نهایی قوانین و قواعد خاص خودش رو داره؛ شما باید بدونین تیپ‌های رایج سؤال‌های امتحان نهایی چیه و باید چطوری بهش جواب بدین. این کادر، مشاوره حرفه‌ای ماست به شما تا فوت و فن‌های امتحان نهایی رو یاد بگیرین.

۲۰ شو:



توی «۲۰ شو»، مبحث هر سؤال رو براتون مرور یا جمع‌بندی کردیم؛ «۲۰ شو» و درسنامه‌هاش دقیقاً فاصله بین نمره خوب و نمره ۲۰ رو براتون پر می‌کنه.

نکته طلایی:



با وجود «۲۰ شو»، که کلی درسنامه مفصل داره، باز هم اگه نکته مهم و مفیدی بود، توی این کادر براتون آوردیم.

تیم اجرایی و تولید آزمون

محدثه عربگری

زهره صفری

محدثه شیخ‌علی

یگانه پورابراهیم

مرضیه بنیانی

زینب مرتضوی

ساره محمدعلی‌نسب

سرپرست آزمون: ارمغان قریب

یک تیم با بیش از ۵۰۰ نفر در حال کار هستن تا آزمون‌های ماز با حداکثر کیفیت حاضر بشن و به شما کمک کنن و مسیر موفقیت رو براتون ساده‌تر کنن. همیشه از نظرات و کامنت‌های خوب‌تون انرژی می‌گیریم. مرسی که همراهمون هستین.

دکتر رسول خنجری

بسته شبیه ساز کنکور

مارکوپولو منتشر شد!

- ✓ ۱۷ دوره کنکور سراسری از ۹۸ تا ۱۴۰۴؛ آپدیت شده و منطبق با تغییرات کنکور ۱۴۰۵
- ✓ پاسخنامه به سبک ماز؛ شامل بررسی دقیق گزینه‌ها، نکته‌ها، جداول و گادرهای جمع‌بندی
- ✓ قابلیت تخمین رتبه و تراز کنکور سراسری؛ براساس نمرات نهایی و درصدهای کنکور
- ✓ آزمون پیش‌بینی کنکور سراسری ۱۴۰۵ از نگاه طراحان ماز
- ✓ تحلیل پاسخنامه ویدیویی سؤالات کنکور توسط اساتید ماز
- ✓ بسته جامع آمادگی امتحانات نهایی خرداد ۱۴۰۵
- بانک کنکور به تفکیک درس به درس و مبحث به مبحث مناسب دوران جمع‌بندی
- بانک کامل سؤالات شیمی و فیزیک کنکور ریاضی مشترک با رشته تجربی



ثبت سفارش
از سایت مازمارکت
mazemarket.ir




اسکن کن!

راهنمای تصحیح آزمون نهایی درس: ریاضی ۳		رشته: علوم تجربی
دوره دوم متوسطه - دوازدهم	تاریخ آزمون: ۱۴۰۴/۱۲/۱۴	ساعت شروع:
آزمون شبیه‌ساز امتحان نهایی	گروه آموزشی ماز	مدت زمان: ۱۱۰ دقیقه
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	مصّحّح شو الف) نادرست (۰/۲۵) (صفحه ۹۱) پ) درست (۰/۲۵) (صفحه ۱۰۴) بررسی دقیق‌تر: الف) تابع در $X=1$ پیوسته نیست. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$ (ت) ممکن است مشتق تابع در نقطه اکسترمم نسبی موجود نباشد. سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۳ دقیقه	۱
۲	مصّحّح شو الف) $X=0$ (محور Y) (۰/۲۵) (صفحه ۹۱) پ) ۲ (۰/۲۵) (صفحه ۹۲) بررسی دقیق‌تر: الف) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty$ ب) $f(x) = 2x^3 + 1 \Rightarrow f'(x) = 6x^2$ $g(x) = \sqrt{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ $(f+g)'(4) + (f \times g)'(1) = f'(4) + g'(4) + f'(1)g(1) + g'(1)f(1) = 96 + \frac{1}{4} + 6 + \frac{3}{2} = 103 \frac{7}{4}$ پ) $f(x) = x^3 + 4x^2 - 1 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 8x \Rightarrow f''(x) = 6x + 8 \Rightarrow f''(-1) = -6 + 8 = 2$ سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه	۱
۳	مصّحّح شو $f'_-(4) = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{(\sqrt{x} - 2)}{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4} \quad (0/25)$ $f'_+(4) = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{\frac{x}{2} - 2}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4^+} \frac{x - 4}{2(x - 4)} = \frac{1}{2} \quad (0/25) \quad (صفحه ۹۱)$ بنابراین از آن جا که $f'_-(4) \neq f'_+(4)$ تابع در $X=4$ مشتق پذیر نیست. (۰/۲۵)	۱/۲۵

نیم‌ماس‌های چپ و راست

• مشتق راست تابع $f(x)$ در نقطه $x = a$:

اگر تابع $f(x)$ در نقطه‌ای به طول $x = a$ از راست پیوسته و مشتق‌پذیر باشد، در این صورت مشتق راست تابع f در این نقطه، همان شیب نیم‌خطی است که از سمت راست $x = a$ بر نمودار تابع f مماس می‌شود که به این نیم‌خط، اصطلاحاً نیم‌ماس راست می‌گوییم.



$$\begin{cases} f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \end{cases}$$

$f'_+(a)$ = شیب نیم‌ماس راست در $x = a$


نکته طلایی

شرط لازم برای وجود مشتق راست در نقطه $x = a$ ، این است که تابع f در این نقطه از راست پیوسته باشد، به عبارت دیگر، اگر تابع f در نقطه $x = a$ پیوستگی راست نداشته باشد، آن‌گاه در این نقطه مشتق راست تعریف نمی‌شود.

معادله نیم‌ماس راست در نقطه $x = a$ برابر است با: $y - f(a) = f'_+(a)(x - a)$

• مشتق چپ تابع $f(x)$ در نقطه $x = a$:

اگر تابع $f(x)$ در نقطه‌ای به طول $x = a$ از چپ پیوسته و مشتق‌پذیر باشد، در این صورت مشتق چپ تابع f در این نقطه، همان شیب نیم‌خطی است که از سمت چپ $x = a$ بر نمودار تابع f مماس می‌شود که به این نیم‌خط، اصطلاحاً نیم‌ماس چپ می‌گوییم.



$$\begin{cases} f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \\ f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \end{cases}$$

$f'_-(a)$ = شیب نیم‌ماس چپ در $x = a$

نکته طلایی دیگر

شرط لازم برای وجود مشتق چپ در نقطه $x = a$ ، این است که تابع f در این نقطه از چپ پیوسته باشد، به عبارت دیگر، اگر تابع f در نقطه $x = a$ پیوستگی چپ نداشته باشد، آن‌گاه در این نقطه مشتق چپ تعریف نمی‌شود.

معادله نیم‌ماس چپ در نقطه $x = a$ برابر است با: $y - f(a) = f'_-(a)(x - a)$

سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه

مصطح شو

ابتدا ضابطه تابع را کمی ساده‌تر می‌کنیم:

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2| \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} |x-2| = f(2) = 0 \Rightarrow |x-2| \text{ در } x=2 \text{ پیوسته (۰/۲۵)}$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{|x-2| - 0}{x-2} = 1 \text{ (۰/۲۵)}$$

حال با تعریف مشتق، داریم:

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{|x-2|}{x-2} = -1 \text{ (۰/۲۵)}$$

بنابراین چون $f'_-(2) \neq f'_+(2)$ ، تابع در $x=2$ مشتق‌پذیر نیست. (۰/۲۵) (صفحه ۹۱)

	مشتق پذیری تابع f را در $x = a$ مشتق پذیر گوییم، هرگاه: (۱) تابع f در $x = a$ پیوسته باشد، یعنی: (۲) مشتق چپ و مشتق راست تابع f در $x = a$ موجود (متناهی) و با هم برابر باشند، یعنی: $f'_+(a) = f'_-(a)$ سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه	
۱	مصطح شو الف) $f(x)$ نمودار یک سهمی با معادله $f(x) = ax^2 + bx + c$ است که چون دهانه سهمی رو به بالاست، $a > 0$ و چون شیب خط مماس بر سهمی در نقطه عرض از مبدأ مثبت است، پس $b > 0$ و در نتیجه: $f'(x) = 2ax + b$ (۰/۲۵) که چون $a, b > 0$، مشتق خطی با شیب و عرض از مبدأ مثبت است، یعنی نمودار (۱) (۰/۲۵) راهنمای مصحح: ۰/۲۵ نمره برای تحلیل نمودار $f(x)$ و پیدا کردن علامت ضرایب a, b قرار داده شده است. ب) نمودار تابع $g(x)$، یک تابع خطی با ضابطه $g(x) = ax + b$ است که در آن شیب منفی ($a < 0$) و عرض از مبدأ مثبت ($b > 0$) است. (۰/۲۵) پس: $g'(x) = a$ که چون $a < 0$، خط افقی، با مقدار منفی است، یعنی نمودار (۴) (۰/۲۵) (صفحه ۹۱) سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه	۵
۱/۲۵	مصطح شو $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{(x+h) - x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}$ (۰/۲۵) (صفحه ۸۶) $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه	۶
۱	مصطح شو با فرض $f(2) = 7$ داریم: (صفحه ۸۷) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{2(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x-2} \times \left(\frac{1}{2}\right) = 5 \Rightarrow f'(2) = 10$ (۰/۲۵) بنابراین با استفاده از قاعده مشتق حاصل ضربی داریم: $g'(x) = (xf(x))' = (x)'f(x) + f'(x)(x) = f(x) + xf'(x)$ $g'(2) = f(2) + 2f'(2) = 7 + 2(10) = 27$ (۰/۲۵) با جای گذاری $x = 2$ داریم: سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۴ دقیقه	۷

۳	الف) مصحح شو (صفحه ۹۲) $f(x) = (\sqrt{x} + 3x)^7 \Rightarrow f'(x) = \underbrace{7}_{(0/25)} \underbrace{(\sqrt{x} + 3x)^6}_{(0/25)} \underbrace{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 3\right)}_{(0/5)}$ ب) $g(x) = (\Delta x^3 - x)^9 (\sqrt{2x+1})$ $g'(x) = 9(\Delta x^3 - x)^8 (15x^2 - 1)(\sqrt{2x+1}) + \left(\frac{1}{\sqrt{2x+1}}\right)(\Delta x^3 - x)^9 \quad (0/5)$ پ) $h(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x^3 - 6x + 1} \Rightarrow h'(x) = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\right)(x^3 - 6x + 1) - (3x^2 - 6)(\sqrt{x+1})}{(x^3 - 6x + 1)^2} \quad (0/25)$	۸
	قواعد مشتق‌گیری • $y = c; c \in \mathbb{R} \rightarrow y' = 0$ • $y = ax + b \rightarrow y' = a$ • $y = \sqrt[n]{x^m} \rightarrow y' = \frac{m}{n\sqrt[n]{x^{n-m}}}$ • $y = (f(x))^n \rightarrow y' = nf'(x)(f(x))^{n-1}$ • $y = f(x) \pm g(x) \rightarrow y' = f'(x) \pm g'(x)$ • $y = f(x) \times g(x) \rightarrow y' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$ • $y = \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow y' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g^2(x)}, (g(x) \neq 0)$ • $y = \sqrt[n]{(f(x))^m} \rightarrow y' = \frac{mf'(x)}{n\sqrt[n]{(f(x))^{n-m}}}$ سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۶ دقیقه مسیر تمرینی: مشابه این سوال در سوال ۱۰ امتحان نهایی خردادماه ۱۴۰۴ مطرح شده بود.	
۱	الف) مصحح شو (صفحه ۸۷) بنابراین با قرار دادن $x = 1$ داریم: $((f+g) \circ f)'(1) = f'(1)(f+g)'(f(1)) = f'(1)(f'(f(1)) + g'(f(1))) = 3(f'(1) + g'(1)) = 3(3 + 5) = 24 \quad (0/5)$ سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۵ دقیقه مسیر تمرینی: مشابه این سوال در سوال ۱۱ امتحان نهایی خردادماه ۱۴۰۴ مطرح شده بود.	۹
۱/۲۵	الف) مصحح شو (صفحه ۹۶) $\text{آهنگ متوسط رشد در } [0, 25] = \frac{f(25) - f(0)}{25 - 0} = \frac{(7(25) + 50) - (50)}{25} = \frac{35}{25} = \frac{7}{5} = 1/4 \quad (0/25)$ ب) (صفحه ۲۲) $f(x) = 7\sqrt{x} + 50 \Rightarrow f'(x) = \frac{7}{2\sqrt{x}} \quad (0/5)$	۱۰

۴) حال برای تشخیص ماکزیمم یا مینیمم بودن نقاط بحرانی داریم:

اگر علامت f' در آن نقطه از مثبت به منفی تغییر کند، آن نقطه، نقطه ماکزیمم نسبی است.

اگر علامت f' در آن نقطه از منفی به مثبت تغییر کند، آن نقطه، نقطه مینیمم نسبی است.

اگر f' در آن نقطه تغییر علامت ندهد، با این روش نمی‌توان درباره ماکزیمم و یا مینیمم نسبی بودن آن نقطه اظهار نظر کرد.

توجه: هر نقطه اکسترمم نسبی، یک نقطه بحرانی است. اما هر نقطه بحرانی لزوماً نقطه اکسترمم نسبی نیست.

یه نمونه باحال

در تابع $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 10$ ، ابتدا نقاط بحرانی تابع را به دست آورید و سپس با رسم جدول تغییرات تابع، نقاط ماکزیمم و مینیمم نسبی آن را در صورت وجود مشخص کنید.

$$D_f = \mathbb{R}$$

برای پیدا کردن نقاط بحرانی تابع f ، مشتق آن را به دست آورده و آن را برابر صفر قرار می‌دهیم، یعنی باید معادله $f'(x) = 0$ را حل کنیم:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \xrightarrow{a+b+c=0} \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$$

بنابراین $x = -3$ و $x = 1$ نقاط بحرانی تابع f می‌باشند، حال با رسم جدول تغییرات، مشتق را تعیین علامت می‌کنیم:

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
f'	+	-	+	
f		↗	↘	↗
		max نسبی	min نسبی	

$$\Rightarrow \begin{cases} x = -3 \rightarrow \text{طول نسبی max} \\ x = 1 \rightarrow \text{طول نسبی min} \end{cases}$$

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x - 10 \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \rightarrow f(-3) = 17 \Rightarrow A(-3, 17) \rightarrow \text{نسبی max} \\ x = 1 \rightarrow f(1) = -15 \Rightarrow B(1, -15) \rightarrow \text{نسبی min} \end{cases}$$

با فرض این‌که تابع $y = f(x)$ مشتق‌پذیر باشد، اگر نقطه (a, b) ، نقطه اکسترمم نسبی تابع f باشد، در این صورت:

$$f'(a) = 0$$

$$f(a) = b$$

سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۲ دقیقه

مسیر تمرینی:

مشابه این سوال در سوال ۱۳ امتحان نهایی خردادماه ۱۴۰۳ مطرح شده بود.

مصحح شو

با توجه به نمودار رسم شده، $f(1) = 2$ (۰/۲۵) پس: (صفحه ۱۱۲) $f(1) = 1 + a + b = 2 \Rightarrow a + b = 1 (*)$ همچنین $x = 1$ ، min نسبی است، پس $f'(1) = 0$ و در نتیجه:

$$f(x) = x^3 + ax + b \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + a \Rightarrow f'(1) = 0 \Rightarrow 3 + a = 0 \Rightarrow a = -3 \quad (۰/۲۵)$$

حال با توجه به معادله $(*)$ ، $b = 4$ (۰/۲۵).

سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۳ دقیقه

۱۴

مصحح شو
 

ابتدا طول نقاط بحرانی را پیدا کرده و با جای‌گذاری آن‌ها در ضابطه $f(x)$ ، مقادیر به‌دست آمده را مقایسه و اکسترمم‌های مطلق را تعیین می‌کنیم. (صفحه ۱۱۲)

$$f(x) = -\frac{2}{3}x^3 - x^2 + 4x + 1$$

$$\Rightarrow f'(x) = -2x^2 - 2x + 4 = 0 \xrightarrow{a+b+c=0} f'(1) = 0, f'(-2) = 0 \quad (0/25)$$

پس باید مقادیر $f(1)$ ، $f(-2)$ ، $f(-3)$ و $f(2)$ را مقایسه کنیم:

$$(0/25) f(1) = -\frac{2}{3} - 1 + 4 + 1 = \frac{10}{3} \Rightarrow \text{max مطلق} \quad (0/25)$$

$$(0/25) f(-2) = \frac{16}{3} - 4 - 8 + 1 = -\frac{17}{3} \Rightarrow \text{min مطلق} \quad (0/25)$$

$$(0/25) f(-3) = 18 - 9 - 12 + 1 = -2$$

$$(0/25) f(2) = -\frac{16}{3} - 4 + 8 + 1 = -\frac{1}{3}$$

سبز بودی یا قرمز؟ بهترین زمان پاسخگویی برای این سوال: ۶ دقیقه



۲۰

موفق باشید.

۱۵