

ریاضی (۲)		بایهٔ یازدهم – رشته: علوم تجربی		تاریخ آزمون:	
فصل ۶ (حد و پیوستگی): جامع ۱				مدت آزمون: ۵۰ دقیقه	
					
ردیف	نمره				
۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. (الف) اگر تابع f و g هیچ کدام در نقطهٔ x_0 حد نداشته باشند، $f + g$ نیز در x_0 حد ندارد. (ب) اگر f در تمام دامنه‌اش پیوسته باشد، می‌گوییم f روی $\mathbb{R}$ پیوسته است. (ج) اگر f در نقطهٔ x_0 پیوسته باشد، آن‌گاه لزوماً $x_0 \in D_f$.				
۲	جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید. (الف) اگر تابع f در بازهٔ (a, x_0) تعریف شده باشد، حد راست f در نقطهٔ x_0 تعریف شده (ب) مجموع نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4x}$ برابر است با (ج) قدرمطلق اختلاف حد راست و چپ تابع $f(x) = \frac{ x^2 - 9 }{x^2 - 9} + \frac{x - 3}{ x - 3 }$ در $x = 3$ برابر با است. (د) تابع $f(x) = -3x - x^2[x]$ در $x = 0$ و در $x = 2$ است. (پیوسته / ناپیوسته)				
۳	گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید. (الف) تابع $f(x) = a[x] + 3[x - 1]$ در نقطهٔ $x = 2$ حد دارد. مقدار a کدام است؟ (ب) مقدار $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{6})^-} [\cot^2 x]$ کدام است؟ (ج) اگر $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ حاصل $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)}$ کدام است؟				
	۱ (۱)	۲ (۲)	۳ (۳)	۴ (۴)	۵ (۵)
۴	پاسخ کوتاه دهید: (الف) تابعی مثال بزنید که در $x_0 = 2$ حدی برابر -2 داشته باشد ولی پیوسته نباشد. (ب) بازه‌ای مثال بزنید که $f(x) = [x]$ در آن پیوسته و ابتدا و انتهای بازه عدد طبیعی باشد.				
۵	حدهای خواسته شده را به دست آورید. (الف) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{5}{x^2} + \frac{3}{x} - \frac{1}{x^3}}{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{6}{x^3}}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+14} - 2\sqrt{x+2}}{x^2 - 4}$ (ج) $\lim_{x \rightarrow 0^-} ([x] + [x^2] + [x^3] + [x^4] + [x^5])$				
۶	با توجه به شکل، مقادیر زیر را بیابید. (الف) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (ب) $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ (ج) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$				
۷	اگر حد تابع f در a موجود و $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{f(x)+1} = 5$ باشد، $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{7-f(x)}$ را به دست آورید.				
۸	اگر تابع $f(x) = \begin{cases} ax^2 + a^2x & x > 2 \\ 3ax + 2b & x = 2 \\ a^2 - 2x & x < 2 \end{cases}$ در $x = 2$ پیوسته باشد، مقدار a و b را به دست آورید.				
۱۰	جمع نمرات				
موفق باشید					

(ب) گزینه «۲» (۰/۲۵)

آزمون ۱۱ (فصل ششم: جامع ۱)

۱ الف) نادرست (۰/۲۵)

تابع $f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$ و $g(x) = \begin{cases} -1 & x > 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$ هر دو در صفر حد ندارند، اما $(f+g)(x) = 0$ ($x \neq 0$) که در تمام نقاط از جمله صفر حد دارد.

(ب) نادرست (۰/۲۵) ممکن است دامنه f برابر با $\mathbb{R}$ نباشد.

(ج) درست (۰/۲۵) یکی از شروط پیوستگی این است که $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ و این

یعنی باید $f(x_0)$ تعریف شده باشد.

۲ الف) نیست (۰/۲۵) زیرا تابع در x_0 دارای همسایگی راست نیست!

(ب) ۴ (۰/۲۵)

شرط لازم پیوستگی f در نقطه x_0 این است که $x_0 \in D_f$ باشد و اگر $x_0 \notin D_f$ ، آن گاه قطعاً f در x_0 ناپیوسته است؛ پس دامنه f را می یابیم:

$$x^2 - 4x = 0 \Rightarrow x(x-4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 4 \end{cases} \Rightarrow D_f = \mathbb{R} - \{0, 4\}$$

و این تابع در صفر و ۴ پیوسته نیست و در سایر نقاط پیوسته است که مجموع این دو نقطه $0 + 4 = 4$ است.

(ج) ۴ (۰/۲۵)

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x^2 - 9}{x^2 - 9} + \frac{x-3}{x-3} \right) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \left(\frac{x^2 - 9}{x^2 - 9} + \frac{x-3}{x-3} \right) = 1 + 1 = 2$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{x^2 - 9}{x^2 - 9} + \frac{x-3}{x-3} \right) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{x^2 - 9}{x^2 - 9} + \frac{x-3}{x-3} \right) = 1 - 1 = 0$$

$$\Rightarrow |2 - 0| = 2$$

(د) پیوسته (۰/۲۵) / ناپیوسته (۰/۲۵)

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= -3(0) - 0^2 \left[\frac{0^+}{0} \right] = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= -3(0) - 0^2 \left[\frac{0^-}{-1} \right] = 0 \\ f(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{تابع در } x=0 \text{ پیوسته است.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -3(2) - 4 \left[\frac{2^+}{1} \right] = -6 - 8 = -14$$

$\Rightarrow$ تابع در $x=2$ ناپیوسته است.


$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -3(2) - 4 \left[\frac{2^-}{1} \right] = -6 - 4 = -10$$

۳ الف) گزینه «۲» (۰/۲۵)

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = a \left[\frac{2^+}{1} \right] + 3 \left[\frac{2^+ - 1}{1} \right] = 2a + 3$$

$$\Rightarrow 2a + 3 = a \Rightarrow a = -3$$

$$L_2 = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = a \left[\frac{2^-}{1} \right] + 3 \left[\frac{2^- - 1}{1} \right] = a$$



می دانیم $\cot \frac{\pi}{6}$ برابر است با $\sqrt{3}$ و چون $x \rightarrow \left(\frac{\pi}{6} \right)^-$ با توجه به این که $\cot$ در ربع اول کاهشی است، پس:

$$\frac{\pi}{6} > \left(\frac{\pi}{6} \right)^- \Rightarrow \cot \frac{\pi}{6} < \cot \left(\frac{\pi}{6} \right)^- \Rightarrow \sqrt{3} < \cot \left(\frac{\pi}{6} \right)^-$$

$$\Rightarrow \cot \left(\frac{\pi}{6} \right)^- = \sqrt{3}^+ \Rightarrow \cot^2 \left(\frac{\pi}{6} \right)^- = 3^+ \Rightarrow \left[\cot^2 \frac{\pi}{6} \right] = [3^+] = 3$$

(ج) گزینه «۴» (۰/۲۵)

$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ اما $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x}$ تعریف نشده و وجود ندارد.

۴ الف) $f(x) = \begin{cases} x-4 & x > 2 \\ -2 & x < 2 \end{cases}$ که $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$ اما چون $f(2)$

تعریف نشده است تابع در $x=2$ ناپیوسته است.

(ب) هر بازه به شکل $[a, b]$ یا (a, b) که در آن ها a و b دو عدد متوالی طبیعی باشد جواب است، مثل $[2, 3]$ یا $(2, 3)$

۵ الف)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\Delta x + 3x^2 - 1}{2x^2 - x + 6}}{\frac{x^2}{2x^2 - x + 6}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x + 3x^2 - 1}{2x^2 - x + 6} = \frac{-1}{6} \quad (0/25)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+14} - 2\sqrt{x+2}}{x^2 - 4} = \frac{0}{0} \text{ مبهم}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+14} - 2\sqrt{x+2}}{x^2 - 4} \times \frac{\sqrt{x+14} + 2\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+14} + 2\sqrt{x+2}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+14} - 2\sqrt{x+2}}{x^2 - 4} \times \frac{\sqrt{x+14} + 2\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+14} + 2\sqrt{x+2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+14-4x-8}{(x^2-4)(\sqrt{x+14}+2\sqrt{x+2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x+6}{(x^2-4)(\sqrt{x+14}+2\sqrt{x+2})} \quad (0/25)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3(x-2)}{(x-2)(x+2)(\sqrt{x+14}+2\sqrt{x+2})} = \frac{-3}{4(4+4)} = \frac{-3}{32} \quad (0/25)$$

(ج)

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} [x] = \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^+] = \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^\Delta] = [0^-] = -1 \quad (0/25)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2] = \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2] = [0^+] = 0 \quad (0/25)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} [x] + \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2] + \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2] + \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^2] + \lim_{x \rightarrow 0^-} [x^\Delta] = -3 \quad (0/25)$$

$$L_1 = \lim_{x \rightarrow 2^+} ax^r + a^r x = 4a + 2a^r \quad (o/p\Delta)$$

$$L_r = \lim_{x \rightarrow 2^-} a^r - rx = a^r - 4 \quad (o/p\Delta)$$

$$\xrightarrow{L_1=L_r} 2a^r + 4a = a^r - 4 \Rightarrow a^r + 4a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (a+2)^r = 0 \Rightarrow a = -2 \quad (o/p\Delta)$$

$$L = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} a^r - rx = \lim_{x \rightarrow 2^+} ax^r + a^r x \xrightarrow{a=-2} \quad (o/p\Delta)$$

$$\Rightarrow f(2) = 0 \quad (o/p\Delta) \Rightarrow 2ax + 2b = 0 \xrightarrow{\frac{a=-2}{x=2}} 2(-2)(2) + 2b = 0$$

$$\Rightarrow 2b = 12 \Rightarrow b = 6 \quad (o/p\Delta)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \quad (o/p\Delta)$$

الف ۶
(ب)

$$\begin{cases} L_1 = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 4 \quad (o/p\Delta) \\ L_r = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -2 \quad (o/p\Delta) \end{cases}$$

$$L_1 \neq L_r \text{ وجود ندارد چون } \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2 \quad (o/p\Delta)$$

ج

۷ فرض می‌کنیم $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{rf(x) + 1}{f(x) + 1} = \frac{r \lim_{x \rightarrow a} f(x) + 1}{\lim_{x \rightarrow a} f(x) + 1} = \frac{rL + 1}{L + 1} = \Delta \quad (o/p\Delta) \Rightarrow \Delta L + \Delta$$

$$= rL + 1 \Rightarrow L = -2 \quad (o/p\Delta)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{y - f(x)} = \sqrt{y - \lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \sqrt{y - (-2)} = \sqrt{y} = 2 \quad (o/p\Delta)$$